

A15 Wintervoedselakker

Beschrijving

Een wintervoedselakker is een perceel of strook waar granen en andere zaaddragende planten niet worden geoogst of ondergeploegd, maar tot ver in de winter blijven staan. Ze vormen in de herfst en winter een rijke voedselbron voor in Nederland overwinterende vogels. Niet geoogste zaden dienen voor hen als voedsel en tevens biedt een wintervoedselakker dekking. Belangrijk is dat er op tijd gezaaid wordt, zodat de planten tot zaadzetting komen.

Vogels komen in grote aantallen op deze wintervoedselveldjes af. Niet alleen zaadetende soorten (patrijs, geelgors, vink, kneu, keep, groenling), maar ook roofvogels (torenavalk, buizerd, blauwe kiekendief, ransuil, velduil) die hier muizen vangen.

Beheereisen

- De beheereenheid a1, a2, b en c bestaat van datum x tot datum x (zie pakketten voor data) van het opvolgende jaar voor 90-100% van de oppervlakte uit minimaal twee soorten zomer- of wintergranen.
- De beheereenheid a3, a4, b2 bestaat van datum x tot datum x (zie pakketten voor data) van het opvolgende jaar voor 90-100 % van de oppervlakte uit afzonderlijke **stroken**/blokken van granen (bijv. zomergerst, zomertarwe, winterrogge) en kruiden.

Aanvullende beheervoorschriften

- Gedurende de aanwezigheid van de wintervoedselakker wordt een rustperiode in acht genomen waarin geen bewerkingen worden uitgevoerd.
- Het gewas wordt niet geoogst of gemaaid.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel plekgewijs mogelijk. Dit wordt alleen in overleg met de veldmedewerker uitgevoerd. Bij aanleg en beheer uitgaan van toepassen 'best-practices' (aanleggen vals zaai-bed etc.) zodat bespuitingen tot een minimum beperkt kunnen worden.
- Bemesten en beweiden is tijdens de looptijd van de wintervoedselakker niet toegestaan.
- Voorafgaand aan de ingangsdatum van het pakket is bemesting toegestaan, omdat dit de zaadzetting en daarmee het ecologisch functioneren stimuleert.
- De granen dienen te worden ingezaaid met een lagere zaaidichtheid (ca. 100 kg/ha) dan gangbaar zodat vogels etc. ook goed tussen het gewas kunnen komen.
- De beheereenheid wordt jaarlijks opnieuw ingezaaid.
- Pakket a: het is gewenst tussen 16 maart en 30 april in te zaaien zodat de verschillende functies van de akker vanaf 15 mei kunnen worden benut. Mocht het zaad niet goed opkomen heb je de tijd om voor 15 mei opnieuw in te zaaien.
- Pakket b: het is gewenst voor 15 augustus in te zaaien, zodat enige zaadvorming mogelijk is en de verschillende functies vanaf 1 september kunnen worden benut.
- Pakket c: het is gewenst voor 15 september in te zaaien, zodat enige kieming mogelijk is en de wintervoedselakker groen de winter ingaat.
- De beheereenheid is minimaal 9 meter breed heeft een oppervlakte van in principe maximaal ca. 3 hectare. Het gaat om maatwerk en daarom kan in overleg met de ANV ook gekozen worden voor grotere oppervlakten tot maximaal ca. 5 hectare, zolang dit ecologisch van waarde is.

- Om de ecologische waarde van grote (>3 ha) wintervoedselakkers te waarborgen wordt samen met de ANV gekeken of een aangepaste invulling nodig is. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de wintervoedselakker in **stroken**/blokken wordt gezaaid, of wordt doorsneden/omringd door (een) brede kruidenrijke zomerrand(en) (**pakket 19 a7**). De concrete invulling wordt in overleg met de ANV bepaald en is bedoeld om de benodigde (structuur) variatie te behouden.
- Om een ecologische meerwaarde te geven aan de wintervoedselakker, dient voor ca. 5% (van het gewicht) een kruidenmengsel te worden toegevoegd. Kruiden moeten een bijdrage leveren aan het wintervoedsel en mogen het graan niet verdringen.
- Voor het kruidenmengsel schrijft ANV Hollands Noorden een zaadmengsel en zaaidichtheid voor.
- Het zaadmengsel voor de kruiden bestelt u bij de ANV.

Adviezen

- Indien een wintervoedselakker het daaropvolgende jaar op dezelfde plek wordt ingezaaid raden we aan om een strook graan van het eerste jaar te laten staan (bij voorkeur langs bomen of middenin het perceel). Dit geeft vogels en andere dieren schuil- en voedselgelegenheid in de tussenliggende periode dat er weinig gewas aanwezig is. De strook is ongeveer 5% van de oppervlakte van de wintervoedselakker. Let op dat u de strook in elk geval niet groter maakt dan max. 10% van het areaal aan wintervoedsel; In de landelijke eisen van het beheerpakket staat namelijk dat minimaal 90% van het perceel bedekt moet zijn met nieuwe inzaai.
- De beheereenheid kan meerdere jaren op dezelfde plek liggen. In verband met veronkruiding wordt geadviseerd de wintervoedselakker niet langer dan twee jaar op hetzelfde perceel uit te voeren. In overleg met de veldmedewerker kan besloten worden de wintervoedselakker langer op dezelfde plek te laten.
- Pakket b en c bij voorkeur alleen toepassen na bollenteelt en dan zo spoedig mogelijk inzaaien, zodra omstandigheden het toelaten.

Pakketten

- 15 a 1. Klei: Wintervoedselakker 15 mei - 15 maart (opvolgende jaar)
2. Zand: Wintervoedselakker 15 mei - 15 maart (opvolgende jaar)
3. Klei-**Stroken**/blokken wintervoedselakker 15 mei - 15 maart (opvolgende jaar)
4. Zand-**Stroken**/blokken-wintervoedselakker 15 mei - 15 maart (opvolgende jaar)
- 15 b 1. Wintervoedselakker 1 september - 15 maart (opvolgende jaar)
2. **Stroken**/blokken-wintervoedselakker 1 september - 15 maart (opvolgende jaar)
- 15 c 1. Wintervoedselakker 1 oktober - 1 augustus (opvolgende jaar)